

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони
здоров'я України

21.07.10 № 596

Реєстраційне посвідчення

№ СА 4888/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ГІНЗЕНГ КОМПОЗИТУМ Н
(GINSENG COMPOSITUM N)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 100 г препарату містять: Panax ginseng 30 % Ø - 20 г, Acidum L(+)-lacticum D2 - 1 г, Hydrastis canadensis D10 - 1 г, Conium maculatum D10 - 1 г, Colchicum autumnale D10 - 1 г, Pulsatilla pratensis D10 - 1 г, Kreosotum D10 - 1 г, Viscum album D8 - 1 г, Sulfur D10 - 1 г, Cinchona pubescens D10 - 1 г, Galium aparine D8 - 1 г, Sempervivum tectorum ssp. tectorum D8 - 1 г, Coenzym A D10 - 1 г, Natrium diethyloxalaceticum D8 - 1 г, Adenosinum triphosphoricum D10 - 1 г, Nadidum D10 - 1 г;

допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена.

Препарат містить 35 % об. етанолу 96 %.

1 мл препарату містить 21 краплю.

Лікарська форма. Краплі оральні.

Прозорий або злегка опалесціючий розчин від світло-жовтого до жовто-коричневого кольору із запахом від слабо пряного до пряного.

Назва і місцезнаходження виробника.

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості для гомеопатичних препаратів не визначаються.

Показання для застосування. У період реконвалесценції після гострих запальних, у тому числі й інфекційних захворювань. У комплексній терапії хронічних, часто рецидивуючих та прогресуючих захворювань (запальних, дегенеративно-дистрофічних), а також після операцій, травм, довготривалого інтелектуального та фізичного перенапруження.

Протипоказання. Хронічні гранулематозні захворювання, аутоімунотерапія, гіпертиреоз із незбалансованим метаболічним станом; гострі запальні захворювання, гіпертонічна хвороба, хвороби, що супроводжуються перезбудженням та гіперкінетичним синдромом, гарячка, а також, якщо відомі алергічні реакції на препарати, що містять Viscum album. Період вагітності та годування груддю. Дитячий вік до 12 років.

Особливі застереження.

Застосування в період вагітності або годування груддю.

Не застосовують.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Препарат містить етанол, що слід враховувати при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Діти.

Препарат застосовують для лікування дітей віком від 12 років.

Спосіб застосування та дози. Разова доза: дорослим і дітям віком від 12 років – 10 крапель 3–6 разів на добу за 15 – 20 хвилин до їди або через годину після.

Краплі розчинити у 10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті (можна не розчиняти, а одразу крапати під язик).

Максимальна добова доза - 60 крапель.

Передозування. Не встановлено.

Побічні ефекти. В окремих випадках можуть виникати реакції гіперчутливості (алергічні реакції шкіри, гарячка), а також поодинокі випадки алергічних реакцій, внаслідок індивідуальної чутливості до компонентів препарату (фенол, хінін). Підвищення артеріального тиску (гіпертонічна хвороба), тахікардія, стани, що супроводжуються Perezбудженням та гіперкінетичним синдромом. Якщо виникли такі реакції, необхідно тимчасово припинити застосування препарату і звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не відома.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Захищати від нагрівання. Закривати флакон негайно після застосування препарату.

Після першого відкриття флакона препарат придатний для застосування протягом 6 місяців.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. Картонна коробка містить скляний флакон-крапельницю по 30 мл.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доосьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу